



**ЗАХИСТІТЬ ДИТИНУ  
ВІД НЕВИЛІКОВНОГО  
ПАРАЛІЧУ, СПРИЧИНЕНОГО  
ПОЛІОМІЄЛІТОМ!**

---

**поліоліміт**

Захисти. Зупини.



Якщо у вашої дитини пропущене чи немає щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ), будь ласка, негайно зверніться до педіатра чи сімейного лікаря!

Невакцинованим або не повністю вакцинованим дітям загрожує невиліковний параліч.

## Як захистити дитину?

Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення. Для боротьби з поліомієлітом в Україні й в усьому світі використовують інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ) та оральну поліомієлітну вакцину (ОПВ).

Вакцини, які використовують державні й приватні клініки, зареєстровані та дозволені для використання в Україні.

## Де можна зробити щеплення?

В Україні вакцинація від поліомієліту входить у перелік обов'язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна отримати безоплатно у вашого сімейного лікаря або педіатра\*.

*\*Якщо лікар або педіатр працює у закладі, що має договір із Національною службою охорони здоров'я України.*


# Як працюють вакцини від поліомієліту?

Інактивована  
поліомієлітна  
вакцина

містить вбитий вірус



Ін'єкції



Оральна  
поліомієлітна  
вакцина

містить ослаблений вірус



Краплі

Захищає від  
паралічу

ВІД ЧОГО ЗАХИЩАЄ

Захищає від  
хвороби і зупиняє  
поширення  
інфекції

Від трьох штамів  
I + II + III

ВІД ЯКИХ ШТАМІВ ВІРУСУ

ТОПВ\* I + II + III  
МОПВ\*\* I або II, або III  
БОПВ\*\*\* I + III  
НОПВ2\*\*\*\* II

\*Тривалентна ОПВ \*\*Моновалентна ОПВ \*\*\*Бівалентна ОПВ \*\*\*\*Моновалентна нОПВ2

Запобігає  
потраплянню дикого  
поліовірусу до  
центральної нервової  
системи, таким чином  
захищаючи від паралічу

ЯК САМЕ ЗАХИЩАЄ

Формує імунітет у  
кишківнику, отже,  
захищає від зараження  
і цим запобігає  
поширенню вірусу.

2 дози ІПВ  
(ін'єкції)

ЯК ВАКЦИНУЮТЬ ДІТЕЙ  
ЗГІДНО З КАЛЕНДАРЕМ

+ 4 дози ОПВ  
(краплі)

1 доза 2 місяці  
2 доза 4 місяці

3 доза 6 місяців  
4 доза 18 місяців  
5 доза 6 років  
6 доза 14 років

## Поліомієліт повернувся в Україну

Кожна невакцинована або не повністю вакцинована дитина зараз у небезпеці.

В Україні критично низький рівень охоплення вакцинацією: лише 80%\* дітей віком до одного року отримали три дози щеплення від поліомієліту за необхідних 95%.

*\*Дані МОЗ України станом на 1.01.2022.*

Поліовірус поширюється непомітно і швидко через відсутність будь-яких симптомів у більшості інфікованих.

## Що спричиняє поліомієліт?

Хворобу викликають поліовіруси, що потрапляють до організму зазвичай через немиті руки та іноді через брудну воду.

Ліків від цієї хвороби не існує, єдиний захист — щеплення.

## Якими можуть бути наслідки хвороби?

Поліомієліт може загрожувати величезній кількості невакцинованих або не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю протягом кількох годин.

Серед тих, кого паралізувало внаслідок поліомієліту, 5–10% помирають через те, що параліч уразив саме дихальні м'язи.